

Renseignements généraux sur la chlamydia

Qu'est-ce que la chlamydia?

La chlamydia est une infection transmise sexuellement causée par une bactérie. La chlamydia est l'une des infections transmises sexuellement les plus courantes en Amérique du Nord.

Qui peut contracter la chlamydia?

Toute personne qui a des relations sexuelles orales, vaginales ou anales avec une personne infectée peut contracter la chlamydia. Une femme enceinte infectée peut aussi transmettre l'infection à son bébé au moment de l'accouchement par voie vaginale.

Quels sont les symptômes de la chlamydia?

La majorité des gens n'ont pas de symptômes. Chez les gens qui présentent des symptômes, ces derniers apparaissent entre 2 et 6 semaines après le contact sexuel avec une personne atteinte. Voici quelques-uns de ces symptômes.

Femmes	Hommes
Écoulement vaginal	Écoulement pénien
Douleur dans le bas-ventre	Douleur en urinant
Saignement après les rapports sexuels	Douleur dans un testicule ou les deux
Douleur en urinant	Douleur rectale
Douleur pendant les rapports sexuels	Saignement rectal
Douleur rectale	Écoulement rectal
Saignement rectal	
Écoulement rectal	

Les bébés infectés par la chlamydia peuvent souffrir d'une infection oculaire quelques jours à plusieurs semaines après leur naissance. Les symptômes sont de la rougeur dans un œil ou dans les deux yeux ou encore un écoulement ou un gonflement des paupières.

Comment traite-t-on la chlamydia?

Un fournisseur de soins de santé (médecin de famille ou infirmière praticienne) vous fera passer un test pour la chlamydia. Si le résultat est positif, il vous prescrira un antibiotique. Après la fin du traitement, le fournisseur de soins de santé pourrait vous faire passer un nouveau test. Sans traitement, la chlamydia peut causer une inflammation pelvienne chez la femme, appelée maladie inflammatoire pelvienne (MIP). La MIP peut être grave et peut affecter la capacité d'une femme à tomber enceinte.

Le traitement contre la chlamydia ne protège pas une personne contre toute infection future. Si une personne est traitée, mais que celle avec qui elle a des relations sexuelles ne l'est pas, il y aura retransmission de la bactérie à la personne traitée. Il est important pour la personne qui reçoit un diagnostic de chlamydia et celle avec qui elle a des relations sexuelles de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles pendant la période de temps conseillée par le fournisseur de soins de santé.

Comment se protéger contre la chlamydia?

Vous pouvez réduire le risque de contracter la chlamydia en ayant des relations sexuelles protégées.

- Limitez le nombre de vos partenaires sexuels.
- Utilisez un condom en latex ou en polyuréthane et une protection buccale chaque fois que vous avez des relations sexuelles, y compris des relations orales et anales.
- Évitez de partager les jouets sexuels. Nettoyez-les et désinfectez-les après chaque usage.