

Renseignements importants sur l'hépatite A et le vaccin contre l'hépatite A

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT.

Qu'est-ce que L'HÉPATITE A?

- L'hépatite A est une infection du foie causée par le virus de l'hépatite A.
- La propagation est oro-fécale et le virus est transmis par contact direct avec des personnes infectées ou indirectement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés.
- Le virus peut causer de la fièvre, de la fatigue, une perte d'appétit, de la nausée, des vomissements, des douleurs abdominales et la jaunisse (peau et yeux jaunes).
- Il est très fréquent que les bébés et les jeunes enfants n'aient pas de symptômes.
- La maladie peut durer plusieurs semaines. La plupart des gens guérissent complètement.

En quoi consiste le vaccin contre L'HÉPATITE A?

- Le vaccin est administré en deux doses. La deuxième dose est administrée de six à douze mois après la première dose.
- La protection accordée par le vaccin dure environ 20 ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir une injection de rappel.

ATTENTION

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin contre l'hépatite A?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du vaccin contre l'hépatite A.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 39,5 °C/103 °F ou plus).

À quoi peut-on s'attendre après l'administration du vaccin contre l'hépatite A?

Les gens devraient rester à la clinique pendant au moins 15 minutes après avoir reçu un vaccin, quel qu'il soit, au cas où ils auraient une réaction. Comme c'est le cas avec tout autre vaccin, il existe une petite possibilité d'avoir une réaction plus grave.

Il est rare d'avoir des effets secondaires du vaccin.

- Certaines personnes pourraient ressentir une légère douleur au point d'injection qui pourrait être rouge.
- D'autres effets secondaires, par exemple une fièvre légère, un mal de tête, un malaise ou des symptômes gastro-intestinaux, sont moins fréquents.

Puisqu'il est possible d'avoir la fièvre, assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions qui accompagnent le produit. Vous ne devriez pas prendre ces médicaments si vous souffrez de certains troubles médicaux. Mentionnez vos antécédents médicaux à votre fournisseur de soins de santé avant de prendre l'un ou l'autre de ces médicaments.

Des questions?

Si vous avez des questions concernant l'hépatite A ou le vaccin contre l'hépatite A, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, consultez les sites Web suivants :

- Immunisation Canada, immunize.ca/fr/default.aspx
- Agence de la santé publique du Canada, phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
- 811, <https://811.novascotia.ca/fr>