

Renseignements importants sur la diphtérie, le tétanos et le vaccin contre la diphtérie et le tétanos (dT)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT.

Qu'est-ce que LA DIPHTÉRIE?

- La diphtérie est une maladie très grave.
- Elle peut causer une infection des voies nasales et de la gorge, pouvant ainsi affecter la respiration.
- Elle peut causer une infection de la peau.
- Elle peut causer une insuffisance cardiaque ou la paralysie.
- Environ une personne sur 10 atteintes de la diphtérie en meurt.
- Il est possible de prévenir la diphtérie par la vaccination.

Qu'est-ce que LE TÉTANOS?

- Le tétanos est une maladie qui survient quand une coupure ou une blessure est infectée par la bactérie du tétanos.
- Cette bactérie, qui se trouve souvent dans la terre, sécrète un poison qui entraîne des spasmes musculaires.
- Il peut s'agir d'une maladie mortelle.
- Il est possible de prévenir le tétanos par la vaccination.

En quoi consiste le vaccin contre la diphtérie et le tétanos (dT)?

- Le vaccin dT offre la meilleure protection contre ces deux maladies.
- C'est la combinaison de deux vaccins en un.
- Il est administré par injection.

Qui devrait recevoir le vaccin dT?

- On recommande des injections de rappel tous les dix ans pour les personnes de 18 ans et plus.

ATTENTION

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin dT?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du vaccin dT.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 39,5 °C/103 °F ou plus).

À quoi peut-on s'attendre après l'administration du vaccin dT?

Les gens devraient rester à la clinique pendant au moins 15 minutes après avoir reçu un vaccin, quel qu'il soit, au cas où ils auraient une réaction. Comme c'est le cas avec tout autre vaccin, il existe une petite possibilité d'avoir une réaction plus grave.

Effets secondaires possibles :

- Avoir de la fièvre dans les 12 heures qui suivent la vaccination est l'effet secondaire le plus commun.
- Il arrive que certaines personnes aient :
 - de la douleur ou une enflure au point d'injection;
 - un petit nodule indolore qui disparaîtra dans les deux mois qui suivent.

Puisqu'il est possible d'avoir de la fièvre, assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions qui accompagnent le produit. Si vous souffrez de certains troubles médicaux, vous ne devriez pas prendre ces médicaments. Mentionnez vos antécédents médicaux à votre fournisseur de soins de santé avant de prendre l'un ou l'autre de ces médicaments.

Des questions?

Si vous avez des questions concernant la diphtérie, le tétanos ou le vaccin dT, veuillez communiquer avec le bureau local de la santé publique ou avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, consultez les sites Web suivants :

- Immunisation Canada, immunize.ca/fr/default.aspx
- Agence de la santé publique du Canada, phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
- 811, <https://811.novascotia.ca/fr>