

Fiche d'information sur le H1N1

Mise à jour : Le 20 novembre 2009

Tableau des recommandations sur les doses du vaccin

Enfants de six mois à neuf ans

Catégorie	Recommandations sur les doses du vaccin
De six mois à trois ans Tous les enfants	2 doses du vaccin avec adjuvant Intervalle minimal de 21 jours entre les deux doses
De trois à neuf ans Enfants atteints d'une maladie chronique ou qui sont immunodéficients	2 doses du vaccin avec adjuvant Intervalle minimal de 21 jours entre les deux doses
De trois à neuf ans Enfants en bonne santé	1 dose du vaccin avec adjuvant pour l'instant

Femmes enceintes

Catégorie	Recommandations sur les doses du vaccin
Femmes enceintes À tout stade de la grossesse	1 dose du vaccin sans adjuvant (de préférence) Si le vaccin sans adjuvant n'est pas disponible, il est possible d'utiliser 1 dose du vaccin avec adjuvant.

Personnes de 10 ans et plus

Catégorie	Recommandations sur les doses du vaccin
De 10 à 64 ans Personnes non immunodéficientes	1 dose du vaccin avec ou sans adjuvant
De 10 à 64 ans Personnes immunodéficientes	1 dose du vaccin avec adjuvant
Personnes de 65 ans et plus	1 dose du vaccin avec adjuvant

